


I.V. House 949S TLC® Foot Splint with Straps (발 부목S) IV Therapy Foot Splint / Directions


일회용 제품입니다. 발의 측면 또는 내측 중 하나에 적합합니다.

TLC 발 부목은 IV를 삽입하고 IV 투브에 연결하기 전 또는 후에 발 또는 발목에 적용할 수 있습니다.



Tips and Tricks for Use of 949S TLC® Foot Splint

각 슬롯에는 2개의 위치가 있다는 점에 유의하십시오.



부목이 발에 맞도록 방향을 잡습니다.
끈이 상단 슬롯에 위치하지 않은 경우 각
슬롯에서 끈을 상단 위치로 이동하십시오.

상단 끈이 다리와 부목의
양쪽 가장자리를 감싸고 있습니다.



발가락 끈을 적용할 때는 발가락 근처의
부목 구멍을 통해 끈을 삽입해야 합니다.

발가락에 있는 부목의 바깥쪽 가장자리를
끈으로 감싸지 마십시오.

발가락 부분에 최종적으로
끈을 적용합니다.



949S TLC® FOOT Splint
4~12개월 또는 체중 6~12kg의
유아에게 적합합니다.

Touch / Look / Compare



I.V. HOUSE®
Protection Over and Above®

· 공식 수입·판매원 : 주식회사 에이블엠앤씨 · CONTACT US 1577-5264

I.V. House 949XS TLC® Foot Splint with Straps (발 부목XS) IV Therapy Foot Splint / Directions


일회용 제품입니다.

발의 측면 또는 내측 중 하나에 적합합니다.

TLC 발 부목은 IV를 삽입하고 IV 투브에 연결하기 전 또는 후에 발 또는 발목에 적용할 수 있습니다.



Tips and Tricks for Use of 949XS TLC® Foot Splint



XS

949XS TLC® Foot Splint
생후 0~4개월 또는 2.5~7kg의
대부분의 신생아에게 적합합니다.

Touch / Look / Compare



I.V. HOUSE®
Protection Over and Above®

· 공식 수입·판매원 : 주식회사 에이블엠앤씨 · CONTACT US 1577-5264